Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie. SK

GC MI Paste Plus™

DENTÁLNY KRÉM NA LOKÁLNU APLIKÁCIU V ÚSTACH S OBSAHOM VÁPNIKA, FOSFÁTU A FLUORIDU

Na použitie len v stomatologickej praxi v doporučených indikáciách.

CHARAKTERISTIKA
GC MI Paste Plus je krém na báze vody, ktorý obsahuje RECALDENT™* (CPP-ACP: fosfopeptid kaseínu - amorfný fosforečnan vápenatý) s fluoridom. Obsah fluoridu je 0,2% w/w (900 ppm), približne rovnaký ako v stredne silných zubných pastách. Pri aplikácii do ústneho prostredia sa CPP-ACP viaže na biofilm, plak, baktérie, hydroxyapatit a mäkké tkanivo a lokalizuje voľne dostupné kalcium, fosfát a fluorid.

DÔLEŽITÉ:
Slinenie zvyšuje účinnosť CPP-ACP a príchuť napomáha stimulovať vylučovanie slín. Čím dlhšie sa CPP-ACP a sliny udržia v ústach, tým je účinok väčší.

Pasta na lokálnu aplikáciu s obsahom voľne dostupného kalcia, fosfátu a fluoridu
1. Poskytuje zubom zvýšenú ochranu.
2. Pomáha neutralizovať kyseliny z acidogénnych baktérií v plaku.
3. Pomáha neutralizovať kyseliny z ostatných vnútorných a vonkajších zdrojov kyselín.

KONTRAINDIKÁCIE
Fosfopeptidy kaseíni sú odvodené od mliečneho kaseínu.
Nepoužívajte tento materiál u pacientov s preukázanou alebo suspektnou alergiou na mliečny protein a/alebo precitlivenosťou, príp. alergiou na benzoátové konzervačné látky.

NÁVOD NA POUŽITIE INDIKÁCIE
a. Po ambulantnom bielení.
b. Po ultrazvukovom, ručnom scalingu alebo ohladení povrchu koreňa.
c. Po profesionálnom vyčistení zubov (P.T.C.).
d. Ako prevencia a kontrola hypersenzitivity.
e. Ako alternatívny spôsob miestnej aplikácie fluoridu u detí od 6 rokov.
f. V priebehu ortodontickej liečby.
g. Pre pacientov s vysokým rizikom zubného kazu.
h. Na miestne pokrytie (coating) u pacientov trpiacich eróziou, xerostómiou alebo Sjögrensovým syndrómom.
i. Pre dospelých pacientov s osobitnými potrebami.

Použitie v ambulancii:
I. Použitie nosiča
1. Nosič pred použitím dôkladne opláchnite pod tečúcou vodou.
2. Vytlačte do nosiča väčšie množstvo GC MI Paste Plus a naneste na horné a / lebo dolné zuby.
3. Nosič nechajte najmenej 3 minúty v ústach pôsobiť.
4. Nosič vyberte.
5. Inštruujte pacienta, aby zvyšok GC MI Paste Plus jazykom rozotrel v ústach a čo najdlhšie v ústach podržal (ešte 1-2 minúty) a usiloval sa nevypľúvať ani neprehĺtať. Čím dlhšie sa GC MI Paste Plus a sliny zadržia v ústach, tým je účinok vyšší.
6. Požiadajte pacienta, aby dôkladne vypľul a ak je to možné nevyplachoval. Zvyšok GC MI Paste Plus na povrchu možno ponechať, aby sa postupne rozptýlil. Informujte pacienta, že 30 minút po aplikácii nesmie jesť ani piť.
7. Ihneď po použití treba zvyšky GC MI Paste Plus v šablóne opláchnuť alebo vyčistiť kefkou pod tečúcou vodou.

I. Použitie bez nosiča:
1. Ak je to potrebné, nadbytočné sliny na povrchu zuba odstráňte vatovým valčekom alebo tampónom. V každom prípade **NIE je potrebné zuby sušiť stlačeným vzduchom.**
2. GC MI Paste Plus naneste na povrch zuba aplikačným tampónom, prstom v rukavici alebo na ťažko prístupných interproximálnych miestach pomocou interproximálnej kefky na čistenie zubov.
3. GC MI Paste Plus nechajte najmenej 3 minúty pôsobiť.
4. Inštruujte pacienta, aby zvyšok GC MI Paste Plus jazykom rozotrel po celej ústnej dutine a čo najdlhšie v ústach podržal (ďalšie 1-2 minúty), pritom nevypľúval a neprehĺtal. Čím dlhšie sa GC MI Paste Plus a sliny zadržia v ústach, tým je účinok vyšší.
5. Požiadajte pacienta, aby dôkladne vypľul a ak je to možné nevyplachoval. Zvyšok GC MI Paste Plus na povrchu možno ponechať, aby sa postupne rozptýlil. Informujte pacienta, že 30 minút po aplikácii nesmie jesť ani piť.

Domáce použitie:
I. Použitie počas dňa po vyčistení zubov podľa odporúčania zubného špecialistu
1. Dostatočné množstvo GC MI Paste Plus - najmenej vo veľkosti hrášku na každý oblúk - naneste na horné a dolné zuby. Materiál treba aplikovať čistým suchým prstom alebo vatovou tyčinkou. Na ťažko dostupné (medzizubné) priestory použite interproximálnu kefku na čistenie zubov alebo zubnú niť s GC MI Paste Plus.
2. GC MI Paste Plus nechajte najmenej 3 minúty pôsobiť.
3. Jazykom rozotrite zvyšok GC MI Paste Plus v ústach a čo najdlhšie v ústach podržte (ešte 1-2 minúty), pritom nevypľúvajte a neprehĺtajte. Čím dlhšie sa GC MI Paste Plus a sliny zadržia v ústach, tým je účinok vyšší.
4. Dôkladne vypľujte a ak je to možné, nevyplachujte. Zvyšok GC MI Paste Plus na povrchu možno ponechať, aby sa postupne rozptýlil. 30 minút po aplikácii nejedzte ani nepite.

IV. Použitie na noc po vyčistení zubov podľa odporúčania zubného špecialistu
Poznámka:
Použitie na noc sa obzvlášť odporúča pre vysoko rizikových pacientov, nie je však vhodné pre deti do 12 rokov.
1. Dostatočné množstvo GC MI Paste Plus - najmenej vo veľkosti hrášku na každý oblúk - naneste na horné a dolné zuby. Materiál treba aplikovať čistým suchým prstom alebo vatovou tyčinkou. Na ťažko dostupné (medzizubné) priestory použite interproximálnu kefku na čistenie zubov alebo zubnú niť s GC MI Paste Plus.
2. GC MI Paste Plus nechajte najmenej 3 minúty pôsobiť.
3. Zvyšok GC MI Paste Plus jazykom rozotrite v ústach a čo najdlhšie v ústach podržte (ešte 1-2 minúty), pritom nevypľúvajte a neprehĺtajte. Čím dlhšie sa GC MI Paste Plus a sliny zadržia v ústach, tým je účinok vyšší.
4. Dôkladne vypľujte a ak je to možné, nevyplachujte. Zvyšok GC MI Paste Plus na povrchu možno ponechať, aby sa postupne rozptýlil. 30 minút po aplikácii nejedzte ani nepite.

PRÍCHUTE
Jahoda, melón, vanilka, máta, Tutti-Frutti

USKLADNENIE

Pred uporabo previdno preberite navodila za uporabo. SL

GC MI Paste Plus™

TOPIKALNA KREMA S KALCIJEM, FOSFATOM IN FLUORIDOM

Uporaba samo za profesionalne namene in za priporočene indikacije.

OPIS
GC MI Paste Plus je krema na vodni osnovi, ki vsebuje RECALDENT™* (CPP-ACP: kazein fosfopeptid - amorfni kalcij fosfat) in ima vključen fluorid. Nivo flourida je 0,2% ut/ut (900ppm), kar je približno toliko kot v zobni pasti za odrasle. Ko vnesete CPP-ACP v ustno okolje, se veže na biofilme, plak, bakterije, hidroksiapatit in mehka tkiva in lokalizira bio-prisoten kalcij, fosfat in flourid.

POMEMBNO:
Slina bo pospešila učinkovitost CPP-ACP in okus bo pomagal stimulirati tok sline. Dlje kot sta CPP-ACP in slina v ustih, bolj učinkovit je rezultat.

Topikalna pasta, ki vsebuje bio-prisoten kalcij, fosfat in flourid
1. Zagotovi dodatno zaščito za zobe.
2. Pomaga nevtralizirati kisline iz acidogenih bakterij v plaku.
3. Pomaga nevtralizirati kisline iz drugih notranjih in zunanjih kislinskih virov.

KONTRAINDIKACIJE
Kazein fosfopeptidi izhajajo iz mlečnega kazeina.
Ne uporabljajte tega materiala pri pacientih z dokazom ali sumom na alergijo na mlečne proteine in/ali preobčutljivostjo ali alergijo na benzoate.

NAVODILA ZA UPORABO INDIKACIJE
a. Po postopku beljenja zob v ambulanti.
b. Po ultrazvočnem ali ročnem luščenju in glajenju korenine.
c. Po profesionalnem čiščenju zob.
d. Preventiva in kontrola preobčutljivosti.
e. Kot alternativna metoda topikalnega nanosa fluoridov pri otrocih starih 6 let in več.
f. Med ortodontskim zdravljenjem.
g. Pri pacientih z visokim tveganjem za karies.
h. Za zagotovitev topikalnega filma pri pacientih z erozijo, kserostomijo ali Sjögrenovim sindromom.
i. Pri odraslih pacientih s posebnimi potrebami.

Nanos v ambulanti:
I. Uporaba pripravljenega modela
1. Pred uporabo pripravljeni model močno sperite pod tekočo vodo.
2. Iztisnite zajetno količino GC MI Paste Plus v model in nanesite na zgornje in/ali spodnje zobe.
3. Model pustite na mestu v ustih minimalno 3 minute.
4. Odstranite model.
5. Preostalo GC MI Paste Plus naj pacient z jezikom razprostre po ustih. Tako naj jo zadrži čim dlje (naslednji 1 – 2 minuti), brez pljuvanja in požiranja. Dlje časa kot sta GC MI Paste Plus in slina v ustih, bolj učinkovit je rezultat.
6. Pacient naj nato močno izpljune, po možnosti brez spiranja. GC MI Paste Plus, ki ostane na površini se postopoma porazgubi. Po nanosu naj pacient ne je in pije 30 minut.
7. V modelu preostalo GC MI Paste Plus je potrebno sprati ali očistiti pod tekočo vodo, takoj po končani uporabi.

II. Uporaba brez modela:
1. Po potrebi odstranite viške sline na zobni površini z vatno rolo ali kroglico. NI potrebno osušiti zob z zrakom.
2. Nanesite GC MI Paste Plus na zobno površino z gobico za nanašanje, orokavičenim prstom ali v težko dostopna interproksimalna področja z Interproximal Tooth Cleaning Brush.
3. Pustite GC MI Paste Plus na mestu minimalno 3 minute.
4. Preostalo GC MI Paste Plus naj pacient z jezikom razprostre po ustih. Tako naj jo zadrži čim dlje (naslednji 1 – 2 minuti), brez pljuvanja in požiranja. Dlje časa kot sta GC MI Paste Plus in slina v ustih, bolj učinkovit je rezultat.
5. Pacient naj nato močno izpljune, po možnosti brez spiranja. GC MI Paste Plus, ki ostane na površini se postopoma porazgubi. Po nanosu naj pacient ne je in pije 30 minut.

Domača uporaba:
III. Nanos po čiščenju zob podnevi po navodilih zobnega strokovnjaka
1. Nanesite ustrezno količino GC MI Paste Plus na zgornje in spodnje zobe. Za vsak lok je potrebno minimalno za grah paste. Material nanesite na zobne površine s pomočjo suhega čistega prsta ali vate. Za težje dostopna področja (med zobmi) uporabite Interproximal Tooth Cleaning Brush ali zobno nitko prevlečeno z GC MI Paste Plus.
2. Pustite GC MI Paste Plus na mestu minimalno 3 minute.
3. Preostalo GC MI Paste Plus naj pacient z jezikom razprostre po ustih. Tako naj jo zadrži čim dlje (naslednji 1 – 2 minuti), brez pljuvanja in požiranja. Dlje časa kot sta GC MI Paste Plus in slina v ustih, bolj učinkovit je rezultat.
4. Pacient naj nato močno izpljune, po možnosti brez spiranja. GC MI Paste Plus, ki ostane na površini se postopoma porazgubi. Po nanosu naj pacient ne je in pije 30 minut.

IV. Nanos po čiščenju zob ponoči po navodilih zobnega strokovnjaka
Navodilo:
Uporaba ponoči je posebej priporočena pri odraslih pacientih z visokim tveganjem, ni pa priporočena za otroke pod 12 let.
1. Nanesite ustrezno količino GC MI Paste Plus na zgornje in spodnje zobe. Za vsak lok je potrebno minimalno za grah paste. Material nanesite na zobne površine s pomočjo suhega čistega prsta ali vate. Za težje dostopna področja (med zobmi) uporabite Interproximal Tooth Cleaning Brush ali zobno nitko prevlečeno z GC MI Paste Plus.
2. Pustite GC MI Paste Plus na mestu minimalno 3 minute.
3. Preostalo GC MI Paste Plus naj pacient z jezikom razprostre po ustih. Tako naj jo zadrži čim dlje (naslednji 1 – 2 minuti), brez pljuvanja in požiranja. Dlje časa kot sta GC MI Paste Plus in slina v ustih, bolj učinkovit je rezultat.
4. Pacient naj nato močno izpljune, po možnosti brez spiranja. GC MI Paste Plus, ki ostane na površini se postopoma porazgubi. Po nanosu naj pacient ne je in pije 30 minut.

OKUSI
Jagoda, melona, vanilija, mint, tuti-fruti

SHRANJEVANJE
Priporočilo za optimalne lastnosti shranjujte v hladnem, suhem prostoru z nizko vlažnostjo, stran od direktne sončne svetlobe (8-25°C) (46,4-77,0°F).

PAKIRANJE
Vsebina tube 40g (35mL)
1. Asortiman
   10 x 40g (po 2 okusa jagode, melone, vanilije, minta, tuti-frutija)
2. Paket z enim okusom
   10 x 40g, okusi vanilije, jagode, melone, tuti-frutija, minta
3. Dodatni paket
   1 x 40g tuba posameznega okusa

NAVODILO
GC MI Paste Plus s svojo edinstveno CPP-ACP formulacijo je bila razvita v šoli The School of Dental Science, Univerza v Melbourneu, Victorija, Avstralija. *RECALDENT je zaščitni znak, ki se uporablja pod licenco. CPP-ACP tehnologija ima podobne patente ali patente v postopku v Avstraliji, NZ, Evropi, Kanadi in ZDA.

Pre upotrebe pažljivo pročitati uputstvo. SR

GC MI Paste Plus™

ZUBNA KREMA SA BIORASPOLOŽIVIM KALCIJUMOM, FOSFATOM I FLUORIDOM

Samo za stručnu stomatološku upotrebu u preporučenim indikacijama.

OPIS
GC MI Paste Plus je krema na bazi vode koja sadrži RECALDENT™* (CPP-ACP: kasein fosfopeptid-amorfni kalcijum fosfat) sa fluoridom. Nivo fluorida iznosi 0,2% w/w (900ppm), što odgovara prosečnoj vrednosti zubne paste za odrasle. Pri primeni CPP-ACP u oralnom okruženju on se veže za biofilmove, plak, bakterije, hidroksiapatit i meko tkivo i otpušta biološki raspoloživ kalcijum, fosfat i fluorid.

VAŽNO:
Saliva poboljšava efikasnost CPP-ACP, a aroma pomaže salivaciju. Što se duže CPP-ACP i saliva zadrže u ustima, rezultat je bolji.

Površin ska pasta koja sadr ži biol oški raspolož iv kalc ijum, fosfat i fluorid
1. Pruža dodatnu zaštitu za zube.
2. Pomaže neutralizovanje izloženosti kiselini iz acidogenih bakterija u plaku.
3. Pomaže neutralizovanje izloženost kiselini iz drugih unutrašnjih i spoljašnjih izvora kiseline.

KONTRAINDIKACIJE
Kasein fosfopeptid se dobija iz mlečnog kaseina.
Ovaj materijal ne sme se koristiti kod pacijenata sa dokazanom ili suspektnom alergijom na mlečne proteine i/ili osetljivošću ili alergijom na benzoatne konzervanse.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU
INDIKACIJE
a. Posle postupaka beljenja u ordinaciji.
b. Posle ultrazvučnog ili ručnog čišćenja zuba ili poliranja površine korena.
c. Posle profesionalnog čišćenja zuba.
d. Prevencija i kontrola preosetljivosti.
e. Kao alternativno sredstvo površinskog nanošenja fluorida kod dece od 6. godine života.
f. Tokom ortodontskog lečenja.
g. Za pacijente sa visokim rizikom karijesa.
h. Za površinsku zaštitu kod pacijenata koji boluju od erozije, kserostomije ili Sjörgen sindroma.
i. Za odrasle pacijente sa specijalnim potrebama.

Primena u ordinaciji:
I. Primena sa individualnom kašikom
1. Individualnu kašiku pre upotrebe dobro isprati pod vodom.
2. Istisnuti debeli sloj GC MI Paste Plus u kašiku i naneti na gornje i/ili donje zube.
3. Kašiku ostaviti u ustima minimalno 3 minuta.
4. Odstraniti kašiku.
5. Pacijentu savetovati da jezikom raspodeli preostalu pastu GC MI Paste Plus u ustima. Uputiti ga da je zadrži u ustima što je duže moguće (još 1-2 minuta) a da je ne ispljune ili proguta. Što se duže GC MI Paste Plus i saliva zadrže u ustima, to je bolji rezultat.
6. Zamoliti pacijenta da dobro ispljune ostatke te ako je moguće izbegne ispiranje. Eventualni ostaci paste GC MI Paste Plus na površini mogu se ostaviti da se postepeno rastvore. Pacijentu savetovati da ne jede i pije 30 minuta posle primene.
7. Ostatke kreme GC MI Paste Plus na kašici isprati pod mlazom vode odmah posle upotrebe.

II. Primena bez kašike
1. Po potrebi vaterolom ili komadićem vate odstraniti višak salive sa površine zuba. Međutim, NIJE potrebno osušiti zube komprimiranim vazduhom.
2. GC MI Paste Plus naneti na zubne površine vatiranim štapićem, prstom u rukavici ili u teško dostupnim aproksimalnim područjima interdentalnom zubnom četkicom.
3. GC MI Paste Plus ostaviti da stoji minimalno 3 minuta.
4. Zatim pacijentu savetovati da jezikom raspodeli preostalu pastu GC MI Paste Plus u ustima. Zatražiti ga da je zadrži u ustima što je duže moguće (dodatnih 1-2 minute) a da je ne ispljune ili ne proguta. Što se duže GC MI Paste Plus i saliva zadrže u ustima, to je bolji rezultat.
5. Zamoliti pacijenta da dobro ispljune ostatke te ako je moguće izbegne ispiranje. Eventualni ostaci paste GC MI Paste Plus na površini mogu da se ostave da se postepeno rastvore. Pacijentu savetovati da ne jede i pije 30 minuta posle primene.

Primena kod kuće:
III. Dnevna primena posle pranja zuba, po preporuci stručnog stomatološkog osoblja
1. Naneti dovoljnu količinu GC MI Paste Plus na gornje i donje zube. Potrebna je minimalna količina veličine zrna graška za svaki zubni luk. Materijal se može naneti na zubne površine čistim suvim prstom ili komadićem vate. Za teško dostupna područja (između zuba) koristiti interdentalnu zubnu četkicu ili zubni konac premazan pastom GC MI Paste Plus.
2. GC MI Paste Plus ostaviti da stoji na zubima minimalno 3 minuta.
3. Zatim pacijentu savetovati da jezikom raspodeli preostalu pastu GC MI Paste Plus u ustima. Zatražiti da je zadrži u ustima što je duže moguće (daljnjih 1-2 minuta) a da je ne ispljune ili ne proguta. Što se duže GC MI Paste Plus i saliva zadrže u ustima, to je bolji rezultat.
4. Dobro ispljuniti i po mogućnosti izbeći ispiranje. GC MI Paste Plus koja je preostala na površini može se ostaviti da se postepeno otopi. Ne jesti ni piti 30 minuta posle nanošenja.

IV. Primena po noći nakon pranja zuba prema preporuci stomatoloških stručnjaka
Pažnja:
Noćna primena paste GC MI Paste Plus specijalno se preporučuje za odrasle pacijente
sa visokim rizikom karijesa. Noćna primena ne preporučuje se deci do 12 godina.
1. Na gornje i donje zube naneti dovoljnu količinu GC MI Paste Plus. Minimalno je potrebna količina veličine graška za svaki zubni luk. Materijal naneti na zubne površine pomoću čistog suvog prsta ili vatenog štapića. Za teška područja (između zuba) koristiti interdentalnu četkicu za čišćenje zuba ili zubni konac obložen GC MI Paste Plus.
2. GC MI Paste Plus ostaviti na zubima barem 3 minuta.
3. Zatim jezikom razmazati preostali GC MI Paste Plus po ustima. Ostaviti u ustima koliko je dugo moguće (još 1-2 minute) izbegavajući ispljuvavanje i odgađajući gutanje. Što se duže GC MI Paste Plus i saliva ostave u ustima, bolji je rezultat.
4. Dobro ispljuniti i po mogućnosti izbeći ispiranje. GC MI Paste Plus koja je preostala na površini može da se ostavi da se postepeno otopi preko noći. Ne jesti ni piti 30 minuta posle nanošenja.

UKUSI
Jagoda, dinja, vanila, menta, tuti-frutti

ČUVANJE

USKLADNENIE

Uchovávajte na chladnom suchom mieste s nízkou vlhkosťou a chráňte pred priamym slnečným svetlom (8-25˚C) (46,4-77,0˚F).

DRUHY BALENÍ

Tuba s obsahom 40 g (35 mL)

1. Výberové balenie
   10 x 40 g (po 2 baleniach jahoda, melón, vanilka, mäta, Tutti-Frutti)
2. Balenie s jednou príchuťou
   10 x 40 g z každej príchute vanilka, jahoda. melón, Tutti-Frutti, mäta
3. Balenie s náhradnou náplňou
   1 x 40 g tuba s každou príchuťou

POZNÁMKA

GC MI Paste Plus s jedinečnou receptúrou CPP-ACP bola vyvinutá na Stomatologickej fakulte Univerzity v Melbourne (The School of Dental Science, The University of Melbourne), v štáte Victoria, Austrálie. *RECALDENT je obchodná značka používaná na základe licencie. K technológii CPP-ACP sa vzťahujú patenty alebo nevybavené patentové prihlášky v Austrálii, na Novom Zélande, Európe, Kanade a USA.

UPOZORNENIE

1. Tubu po použití vždy uzatvorte a odstráňte zvyšky pasty alebo tekutiny okolo hrdla tuby alebo v uzávere.
2. GC MI Paste Plus sa neodporúča používať u pacientov mladších ako 6 rokov.
3. Domáce použitie na noc sa neodporúča u pacientov mladších ako 12 rokov.
4. V prípade zasiahnutia očí ich okamžite vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
5. Prípadné škvrny na odeve zmyte vodou.
6. V prípade, že sa objavia akékoľvek priznaky angioedému, môže to znamenať citlivosť alebo alergiu na benzoátové konzervanty, prípadne na niektorú inú zložku výrobku ako napr. ochucujúca zložka. V takom prípade prerušte používanie výrobku a obráťte sa na lekára.

Niektoré výrobky, ktoré sú uvedené v návode na použitie, môžu byť klasifikované podľa GHS ako nebezpečné. Vždy si prečítajte bezpečnostné listy, ktoré sú k dispozícii na adrese: http://www.gceurope.com/

Môžete ich získať aj u svojho dodávateľa.

Naposledy upravené : 06/2018

OPOZORILO

1. Po uporabi vedno zaprite s pokrovčkom in odtranite preostalo pasto ali vlago okrog vratu tube ali znotraj pokrovčka.
2. Uporaba GC MI Paste Plus ni priporočljiva pri pacientih starih manj kot 6 let.
3. Domači nanos ponoči ni priporočljiv za otroke stare manj kot 12 let.
4. V primeru stika z očmi, takoj sperite z vodo in poiščite pomoč zdravnika.
5. V primeru stika z obleko, sperite z vodo.
6. V primeru pojava simpomov angioedema, lahko to kaže na občutljivost ali alergijo na benzoate ali katero drugo komponento izdelka kot je dodatek za okus. V tem primeru prekinite z uporabo izdelka in napotite pacienta k zdravniku.

Nekateri produkti v IFU so klasificirani kot potencialno nevarni v skladu z GHS. Vedno preberite varnostni list, ki je dosegljiv na: http://www.gceurope.com/

Lahko pa jih dobite tudi pri vašem zastopniku.

Zadnja izdaja : 06/2018

ČUVANJE

Za optimalno korišćenje preporučuje se Čuvati na hladnom i suvom mestu sa niskom vlažnošću daleko od direktne sunčeve svetlosti (8-25°C; 46,4-77,0°F).

PAKOVANJE

Tuba od 40 g (35 mL)

1. Mešovito pakovanje
   10 x 40 g (po 2 ukusa jagode, dinje, vanile, nane i tutti-frutti)
2. Pojedinačno pakovanje
   10 x 40 g u svakoj aromi (vanila, jagoda, dinja, tutti-frutti, nana)
3. Pakovanje za dopunu
   1 x 40 g svih ukusa

PAŽNJA

Pasta GC MI Paste Plus sa svojom jedinstvenom CPP-ACP formulom razvijena je na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Melbourneu, Victoria, Australija. *RECALDENT je registrovan zaštićen znak. CPP-ACP tehnologija je patentirana ili prijavljena za patent u Australiji, Novom Zelandu, Evropi, Kanadi i SAD-u.

UPOZORENJE

1. Tubu uvek zatvoriti posle upotrebe i odstraniti ostatke paste ili vlagu oko vrata tube ili unutar poklopca.
2. Ne preporučuje se koristiti GC MI Paste Plus kod pacijenata mlađih od 6 godina.
3. Kućna noćna primena ne preporučuje se za decu mlađu od 12 godina.
4. U slučaju dodira sa očima, odmah isprati vodom i potražiti lekara.
5. U slučaju prolivanja po odeći, isprati toplom vodom.
6. Pojava simptoma angioedema može ukazivati na osetljivost ili alergiju na benzoatne konzervanse ili na neki sastojak proizvoda kao što je aroma. U tom slučaju upotrebu treba prekinuti i potražiti lekara.

Neki proizvodi navedeni u aktualnom uputstvu za upotrebu mogu se klasifikovati kao opasni u skladu sa Globalno usklađenim sistemom razvrstavanja i označavanja hemikalija (GHS). Uvek se treba upoznati sa sigurnosno-tehničkim listovima proizvoda koji su dostupni na: http://www.gceurope.com/

Mogu se zatražiti i od dobavljača.

Poslednja revizija : 06/2018